

膵臓癌レジメン

療法名	投与量	投与日	投与期間
GnP	ゲムシタビン 1000mg/m ²	day1,8,15	4週毎
	アルブミン懸濁型パクリタキセル 125mg/m ²	day1,8,15	
FOLFIRINOX	イリノテカン 180mg/m ²	day1	2週毎
	オキサリプラチン 85mg/m ²	day1	
	レボホリナート 200mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(急速) 400mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(持続) 2,400mg/m ²	day1	
mFOLFIRINOX	イリノテカン 150mg/m ²	day1	2週毎
	オキサリプラチン 85mg/m ²	day1	
	レボホリナート 200mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(持続) 2,400mg/m ²	day1	
GS	ゲムシタビン 1000mg/m ²	day1,8	3週毎
	S-1 40mg/m ² /回,1日2回	day1~14	
GEM	ゲムシタビン 1000mg/m ²	day1,8,15	4週毎
nal-IRI +FL	nal-IRI(イリノテカンリポソーム製剤) 70mg/m ²	day1	2週毎
	レボホリナート 200mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(持続) 2,400mg/m ²	day1	