レジメン名：FOLFIRI（5-FU+l-LV+CPT-11）＋Rmab 療法　　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①　生食	20mL	1 本	穿刺用
②　生食	100mL		
デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻﾒﾄﾝ）	6.6mg		
グラニセトロン	3mg		
ポララミン	5mg	30 分	
③　生食	mL		
ラムシルマブ（ｻｲﾗﾑｻﾞ）	8mg/kg	60 分（25mg/分を超えない）	
	全量 250mL となるように生食を加える		
	＊PVC フリーのインラインフィルター使用		
④　生食	50mL	フラッシュ用	
⑤　生食	250mL		
イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	150mg/㎡	90 分	
生食	250mL		
レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	側管ｏｒルート２同時投与
⑥　生食	50mL		
5-FU	400mg/㎡	側管から全開で（5 分ぐらい）	
⑦　生食	mL＊		
5-FU	2400mg/㎡	46 時間（インフューザーポンプ）	
＊インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える			
⑧　生食	20mL	1 本	抜針用