レジメン名：FOLFIRI（5-FU+l-LV+CPT-11）＋ザルトラップ療法

大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	6.6mg		
	グラニセトロン	3mg	30 分	
③	生食	100mL		
	アフリベルセプト ベータ（ｻﾞ ﾙﾄﾗｯﾌﾟ）	4mg/kg	60 分	
			＊0.6-8mg/mL の濃度になるようにする	
			＊PVC フリーのインラインフィルター使用	
④	生食	50mL	フラッシュ用	
⑤	生食	250mL		
	イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	150mg/㎡	90 分	
	生食	250mL		
	レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	側管ｏｒルート２同時投与
⑥	生食	50mL		
	5-FU	400mg/㎡	側管から全開で（5 分ぐらい）	
⑦	生食	mL＊		
	5-FU	2400mg/㎡	46 時間（インフューザーポンプ）	
		＊インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える		
⑧	生食	20mL	1 本	抜針用