レジメン名：FOLFOX（5-FU+l-LV+L-OHP）＋Pmab 療法　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	6.6mg		
	グラニセトロン	3mg	30 分	
③	生食	mL		
	パニツムマブ（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6mg/kg	60 分	
		全量 100mL となるように生食を加える		
④	5%ブドウ糖液	250mL		
	オキサリプラチン（ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ）	85mg/㎡	2 時間	
	生食	250mL		
	レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	側管ｏｒルート２同時投与
⑤	生食	50mL		
	5-FU	400mg/㎡	側管から全開で（5 分ぐらい）	
⑥	生食	mL＊		
	5-FU	2400mg/㎡	46 時間（インフューザーポンプ）	
		＊インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える		
⑦	生食	20mL	1 本	抜針用