レジメン名：mFOLFOX6（5-FU+l-LV+L-OHP）＋Bmab 療法　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL　1 本	穿刺用	
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	6.6mg		
	グラニセトロン	3mg	30 分	
③	生食	100mL		
	ベバシズマブ（ｱﾊﾞｽﾁﾝ）	5mg/kg	初回	90 分
			2 回目	60 分
			3 回目以降	30 分
④	5%ブドウ糖	250mL		
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	85mg/㎡	2 時間	
	生食	250mL		
	レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	側管ｏｒルート２同時投与
⑤	生食	50mL		
	5-FU	400mg/㎡	側管から全開で（5 分ぐらい）	
⑥	生食	mL＊		
	5-FU	2400mg/㎡		
			46 時間（インフューザーポンプ）	

＊インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える

⑦	生食	20mL1 本	抜針用