レジメン名：FOLFOXIRI＋B-mab 療法　　催吐リスク：高度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①　生食	20mL　1 本	穿刺用	
②　生食	100mL		
デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30 分	
③　生食	100mL		
ベバシズマブ（ｱﾊﾞｽﾁﾝ）	5mg/kg	初回	90 分
		2 回目	60 分
		3 回目以降	30 分
④　生食	250mL		
イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	165mg/㎡	1.5 時間	
⑤　5%ブドウ糖	250mL		
オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	85mg/㎡	2 時間	
⑤‘生食	250mL		側管ｏｒルート 2
レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	オキサリプラチンと同時投与
⑥　生食		mL＊	
5-FU	3200mg/㎡	46 時間（インフューザーポンプ）	
	インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える		
⑦　生食	20mL1 本	抜針用	

＜内服＞

Day1

①　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	イリノテカン投与 60-90 分前

Day2･3

②　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分 1　朝

Day2-4

③　デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	8mg	分 2　朝昼