レジメン名：SOX＋Bmab 療法　　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈

Day1

① 5%ブドウ糖　100mL
　デキサメタゾン　9.9mg
　グラニセトロン　3mg　30 分

② 生食　100mL
　ベバシズマブ（ｱﾊﾞｽﾁﾝ）　7.5mg/kg　初回　90 分
　2 回目　60 分
　3 回目以降　30 分

③ 5%ブドウ糖　250mL
　オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)　130mg/㎡　2 時間

④ 生食　50mL　フラッシュ用　10 分くらい

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

① 生食　20mL　1 本　穿刺用

② 5%ブドウ糖　100mL
　デキサメタゾン　9.9mg
　グラニセトロン　3mg　30 分

③ 生食　100mL
　ベバシズマブ（ｱﾊﾞｽﾁﾝ）　7.5mg/kg　初回　90 分
　2 回目　60 分
　3 回目以降　30 分

④ 5%ブドウ糖　250mL
　オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)　130mg/㎡　2 時間

⑤ 生食　20mL　1 本　抜針用

〈内服〉

Day1-14

① TS-1　mg/㎡　分 2　朝夕
　Day1　夕-Day15 朝　内服
　Day15 夕-Day22 朝　休薬
　1.25 ㎡未満　80mg/日
　1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満　100mg/日
　1.5 ㎡以上　120mg/日

Day2･3

② デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　分 2　朝昼