レジメン名：SOX+Pmab 療法　　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈

Day1

① 5%ブドウ糖　100mL
　デキサメタゾン　9.9mg
　グラニセトロン　3mg　30 分

② 生食　mL
　パニツムマブ（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）　6mg/kg 1 時間
　全量 100mL となるように生食を加える

③ 5%ブドウ糖　250mL
　オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)　130mg/㎡　2 時間

④ 生食　50mL　フラッシュ用　10 分くらい

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

① 生食　20mL　1 本　穿刺用

② 5%ブドウ糖　100mL
　デキサメタゾン　9.9mg
　グラニセトロン　3mg　30 分

③ 生食　mL
　パニツムマブ（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）　6mg/kg 1 時間
　全量 100mL となるように生食を加える

④ 5%ブドウ糖　250mL
　オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)　130mg/㎡　2 時間

⑤ 生食　20mL　1 本　抜針用

〈内服〉

Day1-14

① TS-1　mg/㎡　分 2　朝夕
　Day1　夕-Day15 朝　内服
　Day15 夕-Day22 朝　休薬
　1.25 ㎡未満　80mg/日
　1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満　100mg/日
　1.5 ㎡以上　120mg/日

Day2･3

② デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　分 2　朝昼