レジメン名：SOX 療法　　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈内注射

Day1

①	5%ブドウ糖	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	130mg/㎡	2 時間
③	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本　穿刺用
②	5%ブドウ糖	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
③	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	130mg/㎡	2 時間
④	生食	20mL	1 本　抜針用

〈内服〉

Day1-14

① TS-1　　mg/㎡　分 2　朝夕

Day1　夕-Day15 朝　内服

Day15 夕-Day22 朝　休薬

1.25 ㎡未満　80mg/日

1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満　100mg/日

1.5 ㎡以上　120mg/日

Day2･3

② デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　分 2　朝昼