レジメン名：TS-1+CPT-11 療法　　胃がん　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方１：　１クール　４週間

〈点滴〉

Day1･15

①　生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30 分	
②　5%ブドウ糖	500mL		
イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	125mg/㎡	90 分	
③　生食	50mL	フラッシュ用	10 分くらい

〈内服〉

Day1-14

①　TS-1　　mg/㎡　　分２　朝夕　Day1 夕-Day15 朝

1.25 ㎡未満	80mg/日
1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	100mg/日
1.5 ㎡以上	120mg/日

Day2･3、Day16･17

②　デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　　分２　朝昼

処方２：　１クール　４週間

〈点滴〉

Day1･8

①　生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30 分	
②　5%ブドウ糖	500mL		
イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	125mg/㎡	90 分	

③　生食　　50mL　　フラッシュ用　　10 分くらい

〈内服〉

Day1-14

①　TS-1　　mg/㎡　　分２　朝夕　Day1 夕-Day15 朝

1.25 ㎡未満　　80mg/日

1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満　100mg/日

1.5 ㎡以上　　120mg/日

Day2･3、Day9･10

②　デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　　分２　朝昼

処方３：　１クール　３週間

〈点滴〉

Day1

①　生食　　100mL

デキサメタゾン　　9.9mg

グラニセトロン　　3mg　　30 分

②　5%ブドウ糖　　500mL

イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）　　150mg/㎡　　90 分

③　生食　　50mL　　フラッシュ用　　10 分くらい

〈内服〉

Day1-14

①　TS-1　　mg/㎡　　分２　朝夕　Day1 夕-Day15 朝

1.25 ㎡未満　　80mg/日

1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満　100mg/日

1.5 ㎡以上　　120mg/日

Day2･3

②　デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　　分２　朝昼