レジメン名：XELOX(Capecitabine+L-OHP)＋Pmab 療法

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　3 週間

〈点滴〉　末梢静脈

Day1

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	生食	mL	
	パニツムマブ(ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ)	6mg/kg	1 時間
			全量 100mL となるように生食を加える
③	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	2 時間
④	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

〈点滴〉　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本　穿刺用
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
③	生食	mL	
	パニツムマブ(ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ)	6mg/kg	1 時間
			全量 100mL となるように生食を加える
④	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	2 時間
⑤	生食	20mL	1 本　抜針用

〈内服〉

Day1-14

①	カペシタビン（ｾﾞﾛｰﾀﾞ）	2000mg/㎡	分 2 朝夕　14 日間
			Day1　夕-Day15 朝　内服
			Day15 夕-Day22 朝　休薬

Day2･3

②	デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	8mg	分 2 朝昼