レジメン名称：フェスゴIN　初回療法　　がん腫：大腸癌　　1クール日数：　21日

| Rp | 薬品名<br>規格 | 投与量 | 単位 | 手技 | 投与<br>ルート | 点滴時間<br>速度 | D1 | D21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | フェスゴIN | 1 | V | 皮下注 | | 8分以上 | ● | |
| | 8分以上かけて翼状針にて大腿部に皮下投与<br>投与後30分間観察<br>調製方法：20mLシリンジにバイアル内薬液すべてを採取<br>採取後、シリンジ先に「オス」をつけた状態で払出<br>新品の「メス」を一緒に払出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

備考

初回は8分以上かけて翼状針にて投与する。
20mLシリンジに薬液すべてを採取する。
採取後、シリンジ先に「オス」をつけた状態で払出する。
新品の「メス」を一緒に払出する。