レジメン名：ロンサーフ＋Bmab 療法　　大腸がん

催吐リスク：低度

処方：1 クール　4 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1・15

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	3.3mg		30 分
③	生食	100mL		
	ベバシズマブ（ｱﾊﾞｽﾁﾝ）	5mg/kg	初回	90 分
			2 回目	60 分
			3 回目以降	30 分
④	生食	50mL	1 本	フラッシュ用

〈内服〉

Day1-5、Day8-12 内服　　Day6-7、Day13-28 休薬

① 　ロンサーフ　　mg/㎡　　分 2　朝夕

5 日間連続経口投与したのち 2 日間休薬する。これを繰り返したのち 14 日間休薬。

1.07 ㎡未満：35mg/回
1.07～1.23 ㎡未満：40mg/回
1.23～1.38 ㎡未満：45mg/回
1.38～1.53 ㎡未満：50mg/回
1.53～1.69 ㎡未満：55mg/回
1.69～1.84 ㎡未満：60mg/回
1.84～1.99 ㎡未満：65mg/回
1.99～2.15 ㎡未満：70mg/回
2.15 ㎡以上：75mg/回