レジメン名：（3 週毎）療法（Vポート）　　胃がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞Vポート使用

Day1

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | KN3 号輸液 | 500mL | |
| | 硫酸 Mg 液 1mEq/mL | 8mL（8mEq） | 60 分 |
| ② | KN3 号輸液 | 500mL | 60 分 |
| ③ | 生食 | 100mL | |
| | デキサメタゾン | 6.6mg | |
| | グラニセトロン | 3mg | 30 分 |
| ④ | 生食 | 250mL | |
| | シスプラチン | 60mg/㎡ | 60 分 |
| ⑤ | フロセミド 20mg | 1A | I.V. |
| ⑥ | 生食 | 250mL | 30 分 |

＜内服＞

Day1-14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① | TS-1 | 分 2 | 朝夕 | Day1 夕-Day15 朝 |
| | | | 1.25 ㎡未満 | 80mg/日 |
| | | | 1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満 | 100mg/日 |
| | | | 1.5 ㎡以上 | 120mg/日 |

Day1

| | | | |
|---|---|---|---|
| ② | アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ) | 125mg | 抗がん剤投与 60-90 分前 |

Day2.3

| | | | |
|---|---|---|---|
| ③ | アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ) | 80mg | 分 1　朝 |

Day2-4

④　デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)　　8mg　　分２　　朝昼