レジメン名：CPT-11+Her 療法　　胃がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　6 週間

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
③	生食	250mL		
	トラスズツマブ	8mg/kg（初回投与）		90 分（初回投与）
④	生食	100mL		
	デキサメタゾン	9.9mg		
	グラニセトロン	3mg		30 分
⑤	生食	250mL		
	イリノテカン(ｶﾝﾌﾟﾄ)	150mg/㎡		90 分
⑥	生食	50mL	1 本	抜針用

Day15・29

①	生食	20mL	1 本	穿刺時
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン	9.9mg		
	グラニセトロン	3mg		30 分
③	生食	250mL		
	イリノテカン(ｶﾝﾌﾟﾄ)	150mg/㎡		90 分
④	生食	50mL	1 本	抜針用

Day22

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
③	生食	250mL		
	トラスズツマブ	6mg/kg（2 回目投与以降）		30 分（2 回目投与以降）
④	生食	50mL	1 本	抜針用

〈内服〉

Day2･3

Day16･17

Day30･31

①	デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	8mg	分２	朝昼