レジメン名：Her+SP（3 週毎）療法（Vポート）　　胃がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞末梢静脈内注射

Day1

① KN3 号輸液	500mL	
硫酸 Mg 液 1mEq/mL	8mL（8mEq）	60 分
② KN3 号輸液	500mL	60 分
③ 生食	50mL	ハーセプチン投与までの維持
④ 生食	250mL	
トラスズツマブ	8mg/kg（初回投与）	90 分（初回投与）
	6mg/kg（2 回目投与以降）	30 分（2 回目投与以降）
⑤ 生食	100mL	
デキサメタゾン	6.6mg	
グラニセトロン	3mg	30 分
⑥ 生食	250mL	
シスプラチン	60mg/㎡	60 分
⑦ フロセミド 20mg	1A	I.V.
⑧ 生食	250mL	30 分

＜点滴＞Vポート静脈内抗がん剤持続注入

Day1

① 生食	20mL	1 本　穿刺用
② KN3 号輸液	500mL	
硫酸 Mg 液 1mEq/mL	8mL（8mEq）	60 分
③ KN3 号輸液	500mL	60 分
④ 生食	50mL	ハーセプチン投与までの維持
⑤ 生食	250mL	
トラスズツマブ	8mg/kg（初回投与）	90 分（初回投与）
	6mg/kg（2 回目投与以降）	30 分（2 回目投与以降）
⑥ 生食	100mL	
デキサメタゾン	6.6mg	
グラニセトロン	3mg	30 分
⑦ 生食	250mL	
シスプラチン	60mg/㎡	60 分
⑧ フロセミド 20mg	1A	I.V.
⑨ 生食	250mL	30 分

＜内服＞

Day1-14

① TS-1	分２	朝夕	Day1 夕-Day15 朝
		1.25 ㎡未満	80mg/日
		1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	100mg/日
		1.5 ㎡以上	120mg/日

Day1

② アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2.3

③ アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１	朝

Day2-4

④ デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	8mg	分２	朝昼