レジメン名：Her+SOX 療法　　胃がん

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈内注射

Day1

①	生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
②	生食	250mL		
	トラスズツマブ	8mg/kg（初回投与）		90 分（初回投与）
		6mg/kg（2 回目投与以降）		30 分（2 回目投与以降）
③	5%ブドウ糖	100mL		
	デキサメタゾン	9.9mg		
	グラニセトロン	3mg		30 分
④	5%ブドウ糖	250mL		
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	100mg/㎡		2 時間
⑤	生食	50mL	フラッシュ用	10 分くらい

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	50mL		ハーセプチン投与までの維持
③	生食	250mL		
	トラスズツマブ	8mg/kg（初回投与）		90 分（初回投与）
		6mg/kg（2 回目投与以降）		30 分（2 回目投与以降）
④	5%ブドウ糖	100mL		
	デキサメタゾン	9.9mg		
	グラニセトロン	3mg		30 分
⑤	5%ブドウ糖	250mL		
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	100mg/㎡		2 時間
⑥	生食	50mL	1 本	抜針用

〈内服〉

Day1-14

① TS-1　　mg/㎡　　分 2　朝夕

Day1　夕-Day15 朝　内服

Day15 夕-Day22 朝　休薬

1.25 ㎡未満	80mg/日
1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	100mg/日
1.5 ㎡以上	120mg/日

Day2･3

② デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　　分 2　朝昼