レジメン名：S1＋DTX 療法　　胃がん

催吐リスク：低～中等度

処方：1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈内注射　2～7 クール目のみ

Day1

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	生食	250mL	
	ドセタキセル(ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙ)	40mg/㎡	1 時間
③	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

＜点滴＞　Vポート静脈内抗癌剤持続注入　2～7 クール目のみ

Day1

①	生食	20mL	1 本　穿刺用
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
③	生食	250mL	
	ドセタキセル(ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙ)	40mg/㎡	1 時間
④	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

〈内服〉

Day1 ﾀ-15 朝まで

① TS-1　mg/㎡　分 2　朝夕

Day1　ﾀ-Day15 朝　内服

Day15 ﾀ-Day22 朝　休薬

1.25 ㎡未満	80mg/日
1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	100mg/日
1.5 ㎡以上	120mg/日