レジメン名：XELOX（Capecitabine+L-OHP）療法　　大腸がん

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞　末梢静脈

Day1

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	130mg/㎡	2 時間
③	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

＜点滴＞　V ポート

Day1

①	生食	20mL	穿刺時
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
③	5%ブドウ糖	250mL	
	オキサリプラチン(ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ)	130mg/㎡	2 時間
④	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい

＜内服＞

Day1-14

①	カペシタビン（ｾﾞﾛｰﾀﾞ）	2000mg/㎡	分 2 朝夕	14 日間
			Day1　夕-Day15 朝　内服	
			Day15 夕-Day22 朝　休薬	

Day2･3

②	デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	8mg	分 2 朝昼	2 日間