レジメン名：FOLFIRINOX（5-FU+L-OHP+l-LV+CPT-11）療法　膵癌

催吐リスク：高度

処方：1 クール　2 週間

＜点滴＞　V ポート静脈内抗癌剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本	穿刺用
②	生食	100mL		
	デキサメタゾン（ﾃﾞｷｻｰﾄ）	9.9mg		
	グラニセトロン	3mg	30 分	
③	5%ブドウ糖液	250mL		
	オキサリプラチン（ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ）	85mg/㎡	2 時間	
④	生食	100mL		
	ブチルスコポラミン	1A	30 分	ルート B
⑤	生食	250mL		
	イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	180mg/㎡	90 分	ルート B
	生食	250mL		
	レボホリナート	200mg/㎡	2 時間	ルート A 同時投与
⑥	生食	50mL		
	5-FU	400mg/㎡	側管から全開で（5 分ぐらい）	
⑦	生食	mL＊		
	5-FU	2400mg/㎡	46 時間（インフューザーポンプ）	

＊インフューザーポンプの容量に合せて必要量の生食を加える

⑧	生食	20mL	1 本	抜針用

＜内服＞

Day1

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2･3

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分 1　朝
③	デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	8mg	分 2　朝昼