レジメン名称：mFOLFIRINOX　　がん腫：膵癌　　1クール日数：14日

Rp	薬品名 規格	投与量	単位	手技	投与 ルート	点滴時間 速度	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D14
Rp1	生理食塩液20mL	1	本	CVポート	本体	ルート確保用	●								
Rp2	生理食塩液100mL	1	本	CVポート	本体		●								
	デカドロン注6.6mg	1	V	CVポート	本体		●								
	デカドロン注3.3mg	1	A	CVポート	本体		●								
	グラニセトロン注3mg	1	A	CVポート	本体	30分	●								
Rp3	5%ブドウ糖液250mL	1	本	CVポート	本体		●								
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/㎡	CVポート	本体	2時間	●								
Rp4	生理食塩液100mL	1	A	CVポート	ルートB		●								
	ブスコパン注	1	A	CVポート	ルートB	30分	●								
Rp5	生理食塩液250mL	1	本	CVポート	ルートB		●								
	イリノテカン点滴静注液	150	mg/㎡	CVポート	ルートB	1.5時間	●								
		レボホリナートと同時に投与													
Rp6	生理食塩液250mL	1	袋	CVポート	ルートA		●								
	レボホリナート点滴静注液	200	mg/㎡	CVポート	ルートA	2時間	●								
		イリノテカンと同時に投与													
Rp7	生理食塩液20mL	必要量		CVポート	本体		●								
	5-FU	2400	mg/㎡	CVポート	本体	46時間	●								
		ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟの容量に合わせて必要量の生食を加える													
Rp8	生理食塩液20mL	1	本	CVポート	本体	抜針用	●								

※末梢投与時はRp7は生理食塩水1000mLに5-FUを追加する。

備考

※高度催吐性リスク
・mFOLFIRINOXはFOLFIRINOX療法からｲﾘﾉﾃｶﾝを180mg/㎡→150mg/㎡に減量、およびbolus 5-FUを中止したレジメン
・アプレピタントCapをday1　125mg　day2-3　80mg内服
・デカドロン錠4mgをday2-4まで内服　朝昼1日2回