レジメン名：イミフィンジ+GC 療法（体重 30kg 以上 1～8 ｺｰｽ）

治癒切除不能な胆道癌

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3 週間

Day1

＜点滴＞

（①‘ 生食	20mL	ポート穿刺時に使用）
① 生食	50mL	デュルブルマブ前 プライミングとして使用
② 生食	100mL	60 分
デュルバルマブ（ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ）	1500mg	インラインフィルター使用
③ 生食	50mL	フラッシュ用　5 分くらい
④ 生食	100mL	
デカドロン	9.9mg	30 分
グラニセトロン	3mg	
⑤ 生食	100mL	30 分
ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	
⑥ 生食	500mL	60 分
シスプラチン	25mg/㎡	
⑦ 生食	50mL	フラッシュ用　5 分くらい

Day8

＜点滴＞

（①‘ 生食	20mL	ポート穿刺時に使用）
① 生食	100mL	
デカドロン	9.9mg	30 分
グラニセトロン	3mg	
② 生食	100mL	30 分
ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	
③ 生食	500mL	60 分
シスプラチン	25mg/㎡	
④ 生食	50mL	フラッシュ用　5 分くらい