レジメン名：DCF 療法　　食道がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞末梢静脈内注射

Day1

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	パロノセトロン(ｱﾛｷｼ)	0.75mg	30 分
②	5%ブドウ糖液	250mL	
	ワンタキソテール	70mg/㎡	1 時間
③	生食	500mL	
	シスプラチン	70mg/㎡	2 時間
④	ヴィーンＦ	1500mL	
	5FU	750mg/㎡	24 時間
⑤	KN3 号輸液	500mL	
	塩酸メトクロプラミド	10mg	2 時間
⑥	KN3 号	500mL	
	フロセミド 20mg	0.5A	2 時間

Day2-5

①	ヴィーンＦ	1500mL	
	5FU	750mg/㎡	24 時間

＜内服＞

Day1

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2.3

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　朝

Day2-5

③	デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	8mg	分２　朝昼

＜点滴＞Vポート静脈内抗がん剤持続注入

Day1

①	生食	20mL	1 本　穿刺用
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	パロノセトロン(ｱﾛｷｼ)	0.75mg	30 分
③	5%ブドウ糖液	250mL	
	ワンタキソテール	70mg/㎡	1 時間
④	生食	500mL	
	シスプラチン	70mg/㎡	2 時間
⑤	ヴィーンＦ	1500mL	
	5FU	750mg/㎡	24 時間
⑥	KN3 号輸液	500mL	
	塩酸メトクロプラミド	10mg	2 時間
⑦	KN3 号	500mL	
	フロセミド 20mg	0.5A	2 時間

Day2-5

①	ヴィーンＦ	1500mL	
	5FU	750mg/㎡	24 時間

＜内服＞

Day1

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2,3

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　朝

Day2-5

③	デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	8mg	分２　朝昼