レジメン名：GC 療法　　尿路上皮癌

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　4 週間

＜点滴＞

Day1

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	30 分
②	生食	100mL	
	ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	30 分
③	アセトキープ 3G	500mL	6時間
④	ソリューゲン F	500mL	7時間

Day2

本体

①	アセトキープ 3G	500mL	6時間
②	ソリューゲン F	500mL	6時間
③	アセトキープ 3G	500mL	6 時間
④	ソリューゲン F	500mL	6時間

側管

①	生食	100mL	
	パロノセトロン(ｱﾛｷｼ)	0.75mg	
	デキサメタゾン	9.9mg	30 分
②	20%マンニットール	300mL	60 分
③	生食	500mL	
	シスプラチン	70mg/㎡	2 時間
④	20%マンニットール	300mL	1 時間

Day3

本体

①	アセトキープ 3G	500mL	6時間
②	ソリューゲン F	500mL	6時間
③	アセトキープ 3G	500mL	6 時間
④	ソリューゲン F	500mL	6時間

側管

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	30 分

Day4

本体

①	アセトキープ 3G	500mL	6時間
②	ソリューゲン F	500mL	6時間
③	アセトキープ 3G	500mL	6 時間

側管

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	30 分

Day8･15

①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	30 分
②	生食	100mL	
	ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	30 分

＜内服＞

Day2

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day3･4

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　朝