レジメン名：DLd 療法（1～2 ｻｲｸﾙ）　　多発性骨髄腫

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　4 週間

＜点滴＞
Day1･8･15･22

①　生食　　100mL
*維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用

②　生食　　mL
ダラツムマブ（ダラザレックス）　16mg/kg

| 投与時期 | 希釈後の総量 | 投与開始からの投与速度(mL/時) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-1 時間 | 1-2 時間 | 2-3 時間 | 3 時間以降 |
| 初回投与 | 1000mL | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 2 回目投与 | 500mL | | | | |
| 3 回目投与以降 | 500mL | 100 | 150 | 200 | |

＜内服＞
Day1-21
① レナリドミド（ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ）　25mg/日

Day1･2、Day8･9、Day15･16、Day22･23
② デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　20mg

Day1･8･15･22
③ アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ)　650mg-1000mg
ジフェンヒドラミン(ﾚｽﾀﾐﾝ)　25-50mg
モンテルカスト(ｷﾌﾟﾚｽ)　10mg　　ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与 1-3 時間前