レジメン名：DLd 療法（3～6 ｻｲｸﾙ）　　**多発性骨髄腫**

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　4 週間

＜点滴＞

Day1･15

①　生食　　100mL

*維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用

②　生食　　mL

ダラツムマブ（ダラザレックス）　16mg/kg

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度(mL/時)			
		0-1 時間	1-2 時間	2-3 時間	3 時間以降
初回投与	1000mL	50	100	150	200
2 回目投与	500mL				
3 回目投与以降	500mL	100	150	200	

＜内服＞

Day1-21

① レナリドミド（ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ）　25mg/日

Day1･2、Day15･16

② デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　20mg

Day8、Day22

③ デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　40mg

Day1･15

④ アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ)　650mg-1000mg

ジフェンヒドラミン(ﾚｽﾀﾐﾝ)　25-50mg

モンテルカスト(ｷﾌﾟﾚｽ)　10mg　　ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与 1-3 時間前