レジメン名：ELd 療法（3 サイクル以降）　　多発性骨髄腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 サイクル　4 週間

＜点滴＞
Day1･15

①　生食　　100mL
＊維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用

②　生食　　50mL
デキサメタゾン　　6.6mg　　15 分
＊ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 45 分前-90 分前

③　5%ブドウ糖液　　mL
注射用水（溶解用）　　mL
エロツズマブ（エムプリシティー）　10mg/kg

| 投与時期 | | 投与速度(mL/分) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 投与開始<br>0-30 分 | 投与開始<br>30-60 分 | 投与開始<br>60 分以降 |
| 第 1 ｻｲｸﾙ | 初回投与 | 0.5 | 1 | 2 |
| | 2 回目投与 | 3 | 4 | |
| | 3 及び 4 回目投与 | 5 | | |
| 第 2 ｻｲｸﾙ以降 | | 5 | | |

| 体重 | 希釈液量 |
|---|---|
| 50kg 未満 | 150mL |
| 50kg-90kg | 250mL |
| 90kg 越え | 350mL |

＊３００ｍｇ製剤の場合は１３mL、
４００mg 製剤の場合は１７ｍＬの注射用水で溶解
＊0.22 ﾐｸﾛﾝ以下のインラインフィルター使用

＜内服＞

Day1-21

① レナリドミド（ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ） 25mg/日

Day1･15

② デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ) 28mg ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 3-24 時間前

③ アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ) 300-1000mg
ジフェンヒドラミン(ﾚｽﾀﾐﾝ) 25-50mg
ファモチジン 20mg
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 45 分前-90 分前

Day8･22

④ デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ) 40mg