レジメン名：EPd 療法（1～2 サイクル）　　多発性骨髄腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 サイクル　4 週間

＜点滴＞

Day1･8･15･22

①　生食　100mL

＊維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用

②　生食　50mL

デキサメタゾン　6.6mg　15 分

＊ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与 45 分前-90 分前

③　5%ブドウ糖液　mL

注射用水（溶解用）　mL

エロツズマブ（エムプリシティー）　10mg/kg

投与時期		投与速度(mL/分)		
		投与開始 0-30 分	投与開始 30-60 分	投与開始 60 分以降
第 1 ｻｲｸﾙ	初回投与	0.5	1	2
	2 回目投与	3	4	
	3 及び 4 回目投与	5		
第 2 ｻｲｸﾙ以降		5		

体重	希釈液量
50kg 未満	150mL
50kg-90kg	250mL
90kg 越え	350mL

＊３００ｍｇ製剤の場合は１３mL、
４００mg 製剤の場合は１７ｍＬの注射用水で溶解

＊0.22 ﾐｸﾛﾝ以下のインラインフィルター使用

＜内服＞

Day1-21

①ポマリドミド（ポマリスト）　4mg/日

Day1･8･15･22

②　デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　28mg　ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 3-24 時間前

③　アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ)　300-1000mg

ジフェンヒドラミン(ﾚｽﾀﾐﾝ)　25-50mg

ファモチジン　20mg

ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 45 分前-90 分前