レジメン名：EPd 療法（3 サイクル以降）　　多発性骨髄腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 サイクル　4 週間

＜点滴＞

Day1

①　生食　100mL

＊維持程度の速度で滴下、最後はフラッシュ用として使用

②　生食　50mL

デキサメタゾン　6.6mg　15 分

＊ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 45 分前-90 分前

③　5%ブドウ糖液　mL

注射用水（溶解用）　mL

エロツズマブ（エムプリシティー）　20mg/kg

| 投与時期 | | 投与速度(mL/分) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 投与開始<br>0-30 分 | 投与開始<br>30 分以降 | |
| | 1 回目投与 | 3 | 4 | |
| | 2 回目投与以降 | 5 | | |

| 体重 | 希釈液量 |
|---|---|
| 50kg 未満 | 150mL |
| 50kg-90kg | 250mL |
| 90kg 越え | 350mL |

＊３００ｍｇ製剤の場合は１３mL、

４００mg 製剤の場合は１７ｍＬの注射用水で溶解

＊0.22 ﾐｸﾛﾝ以下のインラインフィルター使用

＜内服＞

Day1-21

①　ポマリドミド（ポマリスト）　4mg/日

Day1

②　デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　28mg　ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 3-24 時間前

③　アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ)　300-1000mg

ジフェンヒドラミン(ﾚｽﾀﾐﾝ)　25-50mg

ファモチジン　20mg

ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与の 45 分前-90 分前

Day8･15･22

④　デキサメタゾン(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ)　40mg