レジメン名：Isa-Pd 療法（末梢/V ポート）　　多発性骨髄腫

催吐リスク：低度

処方：1 クール　4 週間

＜点滴＞

1 クール目＜Day1.8.15.22＞

2 クール目以降＜Day1.15＞

| | | |
|---|---|---|
| （①‘ 生食 | 20mL | ポート穿刺時） |
| ① 生食 | 100mL | |
| ポララミン | 5m g | 30 分 |
| ファモチジン | 20mg | |
| ② 生食 | 250m L | 全量 250mL にする |
| イサツキシマブ（ｻｰｸﾘｻ） | 10mg/kg | 投与時間は下記参照 |
| | | インラインフィルター使用 |
| ③ 生食 | 50mL | フラッシュ用 |

〇イサツキシマブ投与速度

| ＜初回投与＞ | ＜2 回目以降＞ |
|---|---|
| 投与開始 0～60 分：175mg/時 | 投与開始 0～60 分：175mg/時 |
| 投与開始 60～90 分：225mg/時 | 投与開始 60～90 分：275mg/時 |
| 投与開始 90～120 分：275mg/時 | 投与開始 90～120 分：375mg/時 |
| 投与開始 120～150 分：325mg/時 | 投与開始 120～150 分：400mg/時 |
| 投与開始 150～180 分：375mg/時 | 投与開始 150 分以降：400mg/時 |
| 投与開始 180 分以降：400mg/時 | |

＜内服＞

Day1～21

ポマリドミド（ポマリスト）　1～4mg　分 1

Day1.8.15.22

デキサメタゾン（レナデックス）　40mg　分 1（高齢者は 20mg に減量）

*サークリサ投与日はサークリサ投与前 15～60 分前に内服

Day1（1 クール目 Day1.8.15.22　2 クール目 Day1.15）

カロナール 1000mg（適宜増減）　サークリサ 15～60 分前