レジメン名：wKd 療法　　多発性骨髄腫

催吐リスク：低等度

処方　28 日間

〈点滴〉1 クール目

Day1

（①‘生食　20mL　ポート穿刺時使用）

①　生食　100mL　ルートキープ

②　5%ブドウ糖　50mL

注射用水　必要量　カイプロリス 10mg あたり 5mL で溶解

カルフィルゾミブ（ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ）20mg/㎡　30 分

終了後①の残りの生食でフラッシュ

Day8・15

（①‘生食　20mL　ポート穿刺時使用）

①　生食　100mL　ルートキープ

②　5%ブドウ糖　50mL

注射用水　必要量　カイプロリス 10mg あたり 5mL で溶解

カルフィルゾミブ（ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ）70mg/㎡　30 分

終了後①の残りの生食でフラッシュ

〈点滴〉2 クール目以降

Day1・8・15

（①‘生食　20mL　ポート穿刺時使用）

①　生食　100mL　ルートキープ

②　5%ブドウ糖　50mL

注射用水　必要量　カイプロリス 10mg あたり 5mL で溶解

カルフィルゾミブ（ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ）70mg/㎡　30 分

終了後①の残りの生食でフラッシュ

〈内服〉

Day1・8・15・22

①　デキサメタゾン（ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ）　40mg　分 1