レジメン名：CHOEP 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：高度

処方：　１クール　２週間

＜点滴＞

Day1-3

① 生食　250mL　血管確保用

Day1-3

② 生食　100mL

グラニセトロン　3mg　15 分

Day1

③ 生食　100mL

ドキソルビシン（ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ）　50mg/㎡

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ終了 30 分後に 15 分で施行

Day1

④ 生食　50mL

ビンクリスチン（ｵﾝｺﾋﾞﾝ）　1.4mg/㎡　15 分

Day1

⑤ 生食　500mL

シクロホスファミド（ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ）　750mg/㎡　2 時間

Day1-3

⑥ 生食　500mL

エトポシド（ﾗｽﾃｯﾄ）　100mg/㎡　30 分

Day1-3

⑦ ラクトリンゲル M　500mL　2 時間

＜内服＞

Day1

① アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)　125mg　ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与 60-90 分前

Day2･3

② アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)　80mg　分１　朝

Day1-5

③ プレドニゾロン　100mg/body　分２