レジメン名：DeVIC 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3～4 週間

＜点滴＞

Day1

①	生食	500mL	血管確保用 ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ施行後維持程度で施行 最後のﾒｽﾅ施行後全開滴下、抜去
②	グラニセトロン	3mg	側管より加注 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ直前に施行
③	生食	100mL	
	デキサメタゾン(ﾃﾞｷｻｰﾄ)	40mg/body	30 分
④	5%ブドウ糖	250mL	
	カルボプラチン	300mg/㎡	1 時間 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝに続いてすぐに施行
⑤	5%ブドウ糖	500mL	
	エトポシド	100mg/㎡	2 時間
⑥	生食	100mL	
	メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)	300mg/㎡	30 分
⑦	生食	500mL	
	イホスファミド(ｲﾎﾏｲﾄﾞ)	1500mg/㎡	2 時間
⑧	生食	100mL	
	メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)	300mg/㎡	30 分 ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ投与 4 時間後に施行
⑨	生食	100mL	
	メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)	300mg/㎡	30 分 ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ投与 8 時間後に施行

Day2･3
④を除く Day1 処方