レジメン名：G-B 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：1 クール　4 週間

＜点滴＞

Day1

①	生食	100mL	30 分
	デカドロン	19.8m g	ガザイバ点滴 1 時間前までに終了
②	生食	100mL	60 分
③	生食	210m L	
	オビヌツズマブ（ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ）	1000mg	初回投与は 12.5mL/h から開始
			30 分毎に副作用なければ 12.5mL/h ずつ
			最大で 100mL/h まで速度を上げることができる
			2 回目以降初回副作用なければ 25mL/h から開始
			30 分毎に副作用なければ 25mL/h ずつ
			最大で 100mL/h まで速度を上げることができる
			インラインフィルター使用
④	生食	50mL	30 分
	グラニセトロン	3m g	
⑤	生食	250mL	
	ベンダムスチン	90m g/㎡	60 分
⑥	生食	50mL	フラッシュ用

Day2

①	生食	100mL	
	デカドロン	9.9m g	
	グラニセトロン	3m g	30 分
②	生食	250mL	
	ベンダムスチン	90m g/㎡	60 分
③	生食	50mL	フラッシュ用

Day8・Day15

①	生食	100mL	30 分
	デカドロン	19.8m g	ガザイバ点滴 1 時間前までに終了
②	生食	100mL	60 分
③	生食	210m L	
	オビヌツズマブ（ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ）	1000mg	
			2 回目以降初回副作用なければ 25mL/h から開始
			30 分毎に副作用なければ 25mL/h ずつ
			最大で 100mL/h まで速度を上げることができる
			インラインフィルター使用
④	生食	50mL	30 分

＜内服＞

Day1（1 クール目のみ Day8・Day15 も）

①	クロルフェニラミンﾏﾚｲﾝ酸塩(ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ)	2mg	分 1
	ロキソプロフェン Na	60mg	ガザイバ投与 30 分前