レジメン名：Pola＋BR 療法　　悪性リンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞

1 クール目　Day1

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	50mL	血管確保
② 生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)	375mg/㎡	初回投与は 25mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 100mL/h
		さらに 1 時間後に 200mL/h
		2 クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 200mL/h
③ 生食		フラッシュ

1 クール目　Day2

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
② 生食	100mL	
注射用水	必要量	
ポラツズマブ（ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰ）	1.8mg/kg	初回は 90 分。2 回目以降は 30 分で可

ポライビー30mg は注射用水 1.8mL,140mg は 7.2mL で溶解し 20mg/mL の濃度とし必要量を生食で希釈。

③ 生食	100mL	30 分　様子観察
④ 生食	250mL	
ベンダムスチン（ﾄﾚｱｷｼﾝ）	90mg/㎡	60 分
⑤ 生食	50mL	フラッシュ

1 クール目　Day3

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
② 生食	250mL	
ベンダムスチン（ﾄﾚｱｷｼﾝ）	90mg/㎡	60 分
③ 生食	50mL	フラッシュ

＜内服＞

Day1、2

① ロキソプロフェン 60mg	1 錠	Day1 はリツキサン投与 30 分前
ポララミン 2mg	1 錠	Day2 はポライビー投与 30 分前

＜点滴＞

2 クール目　Day1

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
①生食	50mL	血管確保
②生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)	375mg/㎡	初回投与は 25mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 100mL/h
		さらに 1 時間後に 200mL/h
		2 クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 200mL/h
③ 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
④ 生食	100mL	
注射用水	必要量	
ポラツズマブ（ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰ）	1.8mg/kg　初回は 90 分。2 回目以降は 30 分で可	
ポライビー30mg は注射用水 1.8mL,140mg は 7.2mL で溶解し 20mg/mL の濃度とし必要量を生食で希釈。		
⑤ 生食	100mL	30 分　様子観察
⑥ 生食	250mL	
ベンダムスチン（ﾄﾚｱｷｼﾝ）	90mg/㎡	60 分
⑦ 生食	50mL	フラッシュ

2 クール目　Day2

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	9.9mg	30 分
② 生食	250mL	
ベンダムスチン（ﾄﾚｱｷｼﾝ）	90mg/㎡	60 分
③ 生食	50mL	フラッシュ

＜内服＞

Day1

② ロキソプロフェン 60mg	1 錠	リツキサン投与 30 分前
ポララミン 2mg	1 錠	