レジメン名称： Pola-R-CHP療法(1～6コース目)　がん腫：びまん性大細胞型リンパ腫　　1クール日数：21日

Rp	薬品名 規格	投与量	単位	手技	投与 ルート	点滴時間 速度	D1	D8	D15	D21
Rp1	生理食塩液250mL	1	袋	点滴静注	本体	ルート確保用	●			
	※エンドキサン注終了後全開で									
Rp2	5%ブドウ糖　500mL	1	袋	点滴静注	本体		●			
	リツキシマブBS注	375	mg/㎡							
	※初回投与は最初の30分は50mL/hから開始。その後副作用なければ30分毎に50mL/hから開始。その後副作用なければ30分毎に50mL/hずつ最大400mL/hまであげることができる。 ※2クール目以降初回副作用なければ100mL/hから開始。その後副作用なければ30分毎に100mL/hずつ最大400mL/hまで上げることができる。 ※10倍希釈調製									
Rp3	生理食塩液100mL	1	本	点滴静注	本体	30分	●			
	グラニセトロン注3mg	1	A							
	アロカリス注	235	mg							
Rp4	ポライビー注	1.8	mg/kg	点滴静注	本体		●			
	注射用水20ml	1	V							
	生理食塩液100mL	1	本							
	※初回は90分。2回目以降は30分で可 ※ポライビー30mgは注射用水1.8mL,140mgは7.2mLで溶解し20mg/mLの濃度とし必要量を生食で希釈。									
Rp5	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注	本体	30分	●			
Rp6	生理食塩液100mL	1	本	点滴静注	本体	30分	●			
	ドキソルビシン注	50	mg/㎡							
Rp7	生理食塩液500mL	1	本	点滴静注	本体	2時間	●			
	エンドキサン注	750	mg/㎡							

レジメン名称： Pola-R-CHP療法(7～8コース目)　がん腫：びまん性大細胞型リンパ腫　　1クール日数：21日

Rp	薬品名 規格	投与量	単位	手技	投与 ルート	点滴時間 速度	D1	D8	D15	D21
Rp1	5%ブドウ糖　100mL	1	本	点滴静注	本体	ルート確保用	●			
Rp2	5%ブドウ糖　500mL	1	袋	点滴静注	側管		●			
	リツキシマブBS注	375	mg/㎡							
	※初回投与は25mL/hから開始。1時間後、副作用なければ100mL/h。さらに1時間後に200mL/h ※2クール目以降初回副作用なければ100mL/hから開始。1時間後、副作用なければ200mL/h									

※Vポートはすべてのレジメンにおいて Rp1に生理食塩水20mL　1Aを追加する。

備考

＜内服＞1-6ｺｰｽ目
Day1　　①d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩2mg、ロキソプロフェンNa　60mg　ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前
Day1-5　　② プレドニゾロン（ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ）100mg/day　分2
7-8ｺｰｽ目はリツキシマブのみ（3週間に1回）