レジメン名：R2 療法　　悪性リンパ腫

催吐リスク：低度

処方：　1 クール　4 週間

＜点滴＞

1 クール目　Day1・8・15・22

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	100mL	血管確保
② 生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)	375mg/㎡	初回投与は 25mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 100mL/h
		さらに 1 時間後に 200mL/h
		2 クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 200mL/h

2～5 クール目　Day1

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
①　生食	100mL	血管確保
②　生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)	375mg/㎡	
		2 クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		1 時間後副作用なければ 200mL/h

＜内服＞

1 クール目

Day1・8・15・22

① ロキソプロフェン 60mg	1 錠	
ポララミン 2mg	1 錠	リツキサン投与 30 分前

Day1～21

②　レナリドミド（ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ）	20mg/日	1 日 1 回内服（適宜減量）

2～5 クール目

Day1

① ロキソプロフェン 60mg	1 錠	
ポララミン 2mg	1 錠	リツキサン投与 30 分前

Day1～21

② レナリドミド（ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ）	20mg/日	1 日 1 回内服（適宜減量）