レジメン名：R-CHOP 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞

Day1

① 生食　250mL　血管確保用

ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 終了後全開で

② 5%ブドウ糖/生食　mL　10 倍に希釈調製

リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)　375mg/㎡

初回投与は 25mL/h から開始

1 時間後副作用なければ 100mL/h

さらに 1 時間後に 200mL/h

２クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始

1 時間後副作用なければ 200mL/ｈ

③ 生食　100mL

グラニセトロン　3mg

アロカリス　235mg　30 分

④ 生食　100mL

ドキソルビシン　50mg/㎡　30 分

⑤ 生食　50mL

ビンクリスチン(ｵﾝｺﾋﾞﾝ)　1.4mg/㎡(最大 2mg)　15 分

⑥ 生食　500mL

シクロホスファミド(ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ)　750mg/㎡　2 時間

＜内服＞

Day1

① クロルフェニラミンﾏﾚｲﾝ酸塩(ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ)2mg　分 1

ロキソプロフェン Na　60mg　ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 投与 30 分前

Day1-5

② プレドニゾロン（ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ）　60mg/㎡　分２