レジメン名：R-CVP 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞

Day1

①	生食	250mL	血管確保用 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 終了後全開で
②	5%ブドウ糖	mL	10 倍に希釈調製
	リツキシマブ(ﾘﾂｷｻﾝ)	375mg/㎡	
			初回投与は 25mg/h から開始 1 時間後副作用なければ 100mg/h さらに開始 2 時間後に 200mg/h 2 クール目以降初回副作用なければ 100mg/h から開始
③	グラニセトロン	3mg	
④	生食	50mL	
	ビンクリスチン(ｵﾝｺﾋﾞﾝ)	1.4mg/㎡(最大 2mg)	15 分
⑤	生食	500mL	
	シクロホスファミド(ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ)	750mg/㎡	2 時間

＜内服＞

Day1

①	クロルフェニラミンマレイン酸(ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ)	2mg	
	ロキソプロフェン Na	60mg	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 投与 30 分前

Day1-5

②	プレドニゾロン	100mg/body	分 2