レジメン名：R-DeVIC 療法　　非ホジキンリンパ腫

催吐リスク：中等度

処方：　1 クール　3～4 週間

＜点滴＞

Day0

①	生食	100mL	8 時間で施行
②	5%ブドウ糖	mL	10 倍に希釈調製
	リツキシマブ(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ)	375mg/㎡	
			初回投与は 25mL/h から開始
			1 時間後副作用なければ 100mL/h
			さらに 1 時間後に 200mL/h
			2 クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
			1 時間後副作用なければ 200mL/h
			側管より施行

Day1

①	生食	500mL	血管確保用
			ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 施行後維持程度で施行
			最後のﾒｽﾅ施行後全開滴下、抜去
②	グラニセトロン	3mg	側管より加注
			ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ直前に施行
③	生食	100mL	
	デキサメタゾン(ﾃﾞｷｻｰﾄ)	40mg/body	30 分
④	5%ブドウ糖	250mL	
	カルボプラチン	300mg/㎡	1 時間
			ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝに続いてすぐに施行
⑤	5%ブドウ糖	500mL	
	エトポシド	100mg/㎡	2 時間

⑥　生食　　100mL
　　メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)　　300mg/㎡　　30 分

⑦　生食　　500mL
　　イホスファミド(ｲﾎﾏｲﾄﾞ)　　1500mg/㎡　　2 時間

⑧　生食　　100mL
　　メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)　　300mg/㎡　　30 分
　　ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 投与 4 時間後に施行

⑨　生食　　100mL
　　メスナ(ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ)　　300mg/㎡　　30 分
　　ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 投与 8 時間後に施行

Day2･3
④を除く Day1 処方

＜内服＞
Day0
①　クロルフェニラミンﾏﾚｲﾝ酸塩(ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ)2mg　分 1
　　ロキソプロフェン Na　60mg　　ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 投与 30 分前