レジメン名：R-GDP 療法　　悪性リンパ腫

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　3 週間

＜点滴＞

Day1

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	1000mL	
硫酸 Mg 補正液	20mL	
KCL 注 20mEq キット	20mL	180 分
② 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	
デカドロン	33mg	15 分
③ 生食	100mL	
ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	30 分
④ マンニットール	300mL	30 分
⑤ 生食	500mL	
シスプラチン	75mg/㎡	60 分
⑥ 生食	500mL	60 分

Day8

（①‘生食	20mL	ポート穿刺時　）
① 生食	100mL	ルート確保用
		GEM 終了後フラッシュとして使用
②生食	mL	10 倍に希釈調製
リツキシマブ(ﾘﾂｷｻﾝ)	375mg/㎡　初回投与は 30 分間 50mL/h で開始	
		副作用なければ 30 分毎に 50mL/h 上げて
		最大 400mL/h まで上げられる
		２クール目以降初回副作用なければ 100mL/h から開始
		副作用なければ 30 分毎に 100mL/h 上げて
		最大 400mL/h まで上げられる
③ 生食	100mL	
グラニセトロン	3mg	15 分
④ 生食	100mL	
ゲムシタビン（ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ）	1000mg/㎡	30 分

＜内服＞

Day1

①アプレピタント　125mg

Day2～3

①アプレピタント　80mg

Day2～4

① レナデックス（デキサメタゾン）4mg　　10 錠

Day8

① ロキソプロフェン 60mg	1 錠	リツキサン投与 30 分前
ポララミン 2mg	1 錠	