レジメン名：IP 療法（V ポート）　　神経内分泌がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　4 週間

〈点滴〉

Day1

①	生食	20mL	穿刺用
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	パロノセトロン（ｱﾛｷｼ）	0.75mg	30 分
③	5%ブドウ糖	500mL	
	イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）	60mg/㎡	90 分
④	KN3 号輸液	500mL	
	硫酸 Mg 液	8mEq	60 分
⑤	20%マンニットール注射液	300mL	60 分
⑥	生食	500mL	
	シスプラチン	60mg/㎡	60 分
⑦	生食	500mL	60 分
⑧	KN3 号	500mL	60 分

Day8･15

①	生食	20mL	穿刺用
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	パロノセトロン（ｱﾛｷｼ）	0.75mg	30 分

③ ５%ブドウ糖液　　500mL
　イリノテカン（ｶﾝﾌﾟﾄ）　　60mg/㎡　　90 分

④ 生食　　50mL　　フラッシュ用

〈内服〉
Day1
①　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)　　125mg　　抗がん剤投与 60-90 分前

Day2･3
②　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)　　80mg　　分１　朝

Day2-4
③　デキサメタゾン（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）　8mg　　分２　朝昼

適宜、水分負荷の指示を加える。