レジメン名：VP-16＋CDDP 療法（末梢・Vポート）　神経内分泌細胞がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　4 週間

＜点滴＞末梢/Vポート使用

Day1

（	生食	20mL　ポート穿刺時）	
①	生食	500mL	メイン化学療法終了まで
②	生食	500mL	
	KCL	10mL（10mEq）	
	硫酸 Mg 液 1mEq/mL	4mL（4mEq）	60 分　側管
③	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	
	アロキシ	0.75mg	30 分　側管
④	5%ブドウ糖液	500mL	
	エトポシド	100mg/㎡	90 分　側管
⑤	マンニットール注射液	300mL	30 分　側管
⑥	生食	300mL	
	シスプラチン	80mg/㎡	120 分側管
⑦	生食	500mL	
	KCL	10mL（10mEq）	
	硫酸 Mg 液 1mEq/mL	4mL（4mEq）	60 分　側管
（	生食	20mL　ポート抜針時）	

Day2－3

（	生食	20mL　ポート穿刺時）	
①	生食	500mL	メイン化学療法終了まで
②	生食	100mL	
	デキサメタゾン	6.6mg	30 分 側管
③	5%ブドウ糖液	500mL	
	エトポシド	100mg/㎡	90 分　側管
（	生食	20mL　ポート抜針時）	

＜内服＞

Day1

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2.3

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分 1　朝