レジメン名：Atezolizumab+VP-16+CBDCA 療法　　小細胞肺癌

催吐リスク：中等度

処方：　１クール　３週間

導入療法(1～4 クール)

＜点滴＞

Day1

①　生食	50mL	15 分	
②　生食	100mL		
アテゾリズマブ（ﾃｾﾝﾄﾘｸ）	1200mg	初回	60 分
		２回目以降	30 分
		インラインフィルター使用	
③　生食	50mL	フラッシュ用	10 分くらい
④　生食	100mL		
デキサメタゾン	9.9mg		
グラニセトロン	3mg	30 分	
⑤　5%ブドウ糖	500mL		
エトポシド	100mg/㎡	90 分	
⑥　生食	250mL		
カルボプラチン	AUC5	60 分	
⑦　生食	50mL	フラッシュ用	10 分ぐらい

Day2－3

①　生食	50mL	15 分	
②　生食	100mL		
デキサメタゾン	6.6mg	30 分	
③　5%ブドウ糖	500mL		
エトポシド	100mg/㎡	90 分	
④　生食	50mL	フラッシュ用	10 分ぐらい

＜内服＞

Day1

①　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2.3

②　アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　　朝

２枚目に続く

維持療法(5ｸｰﾙ～)

＜点滴＞

Day1

①	生食	50mL	15 分
②	生食	100mL	
	アテゾリズマブ（ﾃｾﾝﾄﾘｸ）	1200mg	初回　60 分
			2 回目以降　30 分
			インラインフィルター使用
③	生食	50mL	フラッシュ用　10 分くらい