レジメン名：CDDP+S1　RT 併用療法（末梢・Vポート）　　肺がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　4 週間

＜点滴＞末梢/Vポート使用

Day1

（	生食	20mL　ポート穿刺時）	
①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	ヴィーンF	500mL	
	硫酸 Mg 液 1mEq/mL	8mL（8mEq）	60 分
③	マンニットール注射液	300mL	40 分
④	生食	250mL	
	シスプラチン	60mg/㎡	60 分
⑤	ヴィーンF	500mL	60 分
（	生食	20mL　ポート抜針時）	

＜内服＞

Day1-14

①	TS-1	分２	朝夕	Day1 夕-Day15 朝
			1.25 ㎡未満	80mg/日
			1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	100mg/日
			1.5 ㎡以上	120mg/日

Day1

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2-3

③	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　朝

Day2-4

④	デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	8mg	分２　朝昼