レジメン名：CDDP＋VNR　RT 併用療法（末梢・Vポート）　　肺がん

催吐リスク：高度

処方：　1 クール　4 週間

＜点滴＞末梢/Vポート使用

Day1

（	生食	20mL　ポート穿刺時）	
①	生食	100mL	
	デキサメタゾン	9.9mg	
	グラニセトロン	3mg	30 分
②	生食	50mL	
	ビノレルビン（ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ）	20mg/㎡	5 分
③	ヴィーンＦ	500mL	
	硫酸 Mg 液 1mEq/mL	8mL（8mEq）	60 分
④	マンニットール注射液	300mL	40 分
⑤	生食	250mL	
	シスプラチン	80mg/㎡	60 分
⑥	ヴィーンＦ	500mL	60 分
（	生食	20mL　ポート抜針時）	

Day8

（	生食	20mL　ポート穿刺時）	
①	生食	50mL	30 分
②	生食	50mL	
	ビノレルビン（ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ）	20mg/㎡	5 分
③	生食	250mL	30 分

＜内服＞

Day1

①	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	125mg	抗がん剤投与 60-90 分前

Day2.3

②	アプレピタント(ｲﾒﾝﾄﾞ)	80mg	分１　朝

Day2-4

③	デキサメタゾン(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	8mg	分２　朝昼