レジメン名：Cmab＋PTX 療法　　頭頸部癌

催吐リスク：低等度

処方　１クール　７日間

〈点滴〉１クール目

Day1

（①‘生食		20mL	ポート穿刺時使用）
①	生食	100mL	30 分
	デカドロン	9.9mg	
	ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5m g	
②	生食	必要量	
	セツキシマブ（ｱｰﾋﾞ ﾀｯｸｽ）	400mg/㎡	120 分
		トータル量が 500mL となるように生食で希釈	
③	生食	100mL	60 分
		様子観察のため	
④	生食	250mL	60 分
	パクリタキセル	80mg/㎡	
⑤	生食	50mL	フラッシュ

＜点滴＞2 クール目以降

Day1

（①‘生食		20mL	ポート穿刺時使用）
①	生食	100mL	30 分
	デカドロン	9.9mg	
	ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5m g	
②	生食	必要量	
	セツキシマブ（ｱｰﾋﾞ ﾀｯｸｽ）	250mg/㎡	60 分
		トータル量が 250mL となるように生食で希釈	
③	生食	50mL	フラッシュ
④	生食	250mL	60 分
	パクリタキセル	80mg/㎡	
⑤	生食	50mL	フラッシュ